

Herkenning van Vogels

1. **Boomleeuwerik**
Opvallend korte, afgesneden staart. Ronde Vleugels. Vlucht fladderend als bij Veldleeuwerik
2. **Veldleeuwerik**
Spitse vleugels. Langere staart dan Boomleeuwerik. Staartvork duidelijk zichtbaar. Op afstand rukkiger, lijsterachtige vlucht, waarbij lijsters in verhouding tot het lichaam kleinere vleugels hebben.
3. **Strandleeuwerik**
Doet bijna pieperachtig slank aan. Spitse vleugels.
4. **Oeverzwaluw**
Bruine bovenzijde en kropband. Vleugelslagen roeiender als bij Boerenzwaluw, maar frequentie hoger (tussen Boeren- en Huiszwaluw in).
5. **Boerenzwaluw**
Groter dan Huiszwaluw. Staalblauwe bovenkant, donkere keelvlek. Vleugelslagfrequentie lager dan bij Huiszwaluw (belangrijk op grote afstand). Vlucht maakt soepelere indruk; tijdens jacht-vlucht vaak elegante koerswijzigingen. Diepgevorkte staart ook bij jongen te zien.
6. **Huiszwaluw**
Keel, onderzijde en stuit wit. Zwak gevorkte staart. Vleugelslagfrequentie veel hoger en fladerender dan Boerenzwaluw. In jacht-vlucht vaak abrupte koerswijzigingen.
7. **Grote Pieper**
Deze lijkt in de vlucht en de tekening het meest op Duinpieper, echter de borst is duidelijk contrasterend met de lichte onderkant, zoals bij een juveniele Duinpieper. Combinatie dikke buik en lange staart accentueren fors postuur van de vogel.
8. **Duinpieper**
Zandkleurig tot vaalbruin. Geen contrasten in de lichaamstekening. Slank met lange staart. Aanzet tot de rustige boogvlucht van kwikstaarten.
9. **Boompieper**
Contrastrijk van lichte buik afgegrensde donkere borst. Rukkerige vlucht, maar langzamer dan Witte Kwikstaart en Duinpieper; iets fladderender.
10. **Graspieper**
Maakt een korte en minder slanke indruk dan de Rietgors en andere piepers. Ronde vleugels, een spartelende en weinig vorderende vlucht, waarbij op enkele vleugelslagen een in lengte verschillende boogvlucht volgt. Valt bij elke boog dieper door dan Boompieper, Heggenmus of Rietgors. Wordt op trek door alle kwikstaarten en andere piepers ingehaald. De vogel maakt een eenkleurige indruk. De snavel wordt, zoals bij alle piepers en kwikstaarten, in de vlucht slechts zwak naar beneden gehouden (vgl. Heggenmus).
11. **Roodkeelpieper**
Vliegeigenschappen overeenkomend met Boompieper.
12. **Oeverpieper**
Groter en met iets langere staart en vleugels dan Graspieper. Vliegt rustiger dan deze. Contrastrijker getekend dan Graspieper: bovenzijde donker, onderzijde licht.
13. **Waterpieper**
In vlucht sterk gelijkend op Oeverpieper. Geluid 'met een R'.
14. **Gele Kwikstaart**
Kwikstaart met de kortste staart en zwakke golfvlucht. Onderzijde gelijkmatig geel, in de herfst vaak zandkleurig als bij Duinpieper. Geen opvallende vleugelstreep.
15. **Grote Gele Kwikstaart**
Zeer lange staart. Vlucht met lange en diepe golven. Opvallend witte vleugelstreep op donkere vleugel, ook op onderzijde goed zichtbaar. Intensiteit van het geel op de onderkant naar de staart toenemend bij herfstvogels. In de herfst lichte keel.

Herkenning van Vogels

16. Witte Kwikstaart

Slechts een zwak aangeduide witte vleugelstreep op een betrekkelijk lichte vleugel. De witte partijen kunnen bij ongunstige omstandigheden een gele indruk maken. Juveniele vogels hebben soms een geelachtige kop en keel. Bij herfstvogels altijd een zwarte keelband. Staartlengte tussen die van Gele Kwikstaart en Grote Gele Kwikstaart in, hetzelfde geldt voor de golfvlucht.

17. Heggenmus

Eenkleurig, zonder contrasten. Houdt de snavel in een hoek van van 30 graden omlaag en lijkt daardoor meer een stierenek te hebben dan de in de vlucht erop gelijkende Graspieper. De vleugelslagen maken een snorrende indruk. Door lange vleugelslagfasen met slechts korte pauzes valt ze weinig door, de boogvlucht is slechts kort aangeduid. De vlucht is onbeholpen, vaak met richtingsveranderingen.

18. Beflijster

Lichte halvemaaanvormige vlek meer of minder sterk ontwikkelt. Door witachtige veerzomen aan vleugels en kleine veren een grauwe tot matzwarte indruk makend. Albinistische Merels zijn contrastrijker. Spitste lange vleugels, rechtlijniger vlucht dan Merel en vliegt veel beter dan deze.

19. Merel

Zwart of donkerbruin, adulte mannetjes met gele snavel. Zeer ronde, korte vleugel. Slechtste vlieger onder de lijsters. Vliegt in zeer losse groepen of ketens en heeft een grote spreiding in vleugelslagfrequentie. De zeer onrustige vlucht wordt veroorzaakt door het feit dat na 1 tot 3 vleugelslagen rustfasen van zeer wisselende lengte worden aangehouden.

20. Kramsvogel

Licht-donker contrasten op buik en rug, witte vleugelonderdekveren. Bultiger dan de Grote Lijster, vliegt slechter dan deze. Op ongeveer 3-5 vleugelslagen volgt een pauze. Ten gevolge van de onzekere vlucht veranderen de losse, maar soms zeer grote groepen voortdurend van vorm.

21. Zanglijster

Oranjekleurige vleugelonderdekveren, lichtbruine rug, geen opvallende koptekening. Snelle vlucht.

22. Koperwiek

Roodbruine ondervleugeldekveren en flanken. Opvallende koptekening. Chocoladebruine rug. Spitsere vleugels dan de Zanglijster. De vlucht, vaak in tamelijk dichte groepen, is Spreeuw-achtiger dan bij Zanglijster.

23. Grote Lijster

Eenkleurige, bruine bovenkant. Eenkleurige bruinige onderkant, witte ondervleugeldekveren. Houdt (waarschijnlijk) de kop wat hoger, de ruglijn maakt (daardoor?) een bijna rechte indruk en de vogel lijkt slanker. Zeer rustige, doelgerichte, bijna duifachtige vlucht, waarbij op ongeveer zeven tot vijftien vleugelslagen een pauze volgt.

24. Zwarte Mees

Ongeproportioneerd dikkoppig en met korte staart. Kop zwartwit. Zelden in gezelschap van Kool- en Pimpelmees, die sneller vliegen. Vlucht doelgerichter dan Goudhaantje (deze heeft ook een korte staart, maar heeft ander koptekening).

25. Pimpelmees

Staatlengte normaal. Kop op grote afstand zonder contrasttekening en vooral bij zon een witte indruk makend. Daardoor (?) kleinkoppiger lijkend dan de soorten met een zwarte kop. Dezelfde vliegeigenschappen als Koolmees en vaak in gezelschap daarvan.

Herkenning van Vogels

26. **Koolmees**
Kop- en staartproporties 'normaal'. Kop zwartwit.
27. **Ringmus**
Contrastrijke koptekening, kleine zwarte keelvlak. Minder wit in de vleugel dan het mannetje van de Huismus. Trekt in samengebalde zwermen met een rechtlijnige vlucht. De vleugelslagen zijn snel en snorrend.
28. **Vink**
Contrastloze tekening op de bovenzijde. Eenkleurige grauwe tot roodbruine bovenkant. Witte vleugelspiegel. Staart recht afgesneden of nauwelijks ingekeept.
29. **Keep**
Van de witte buik contrastrijkt afgegrensde donkere borst. Witte stuit, oranje schouders, diepe staartvork. Exemplaren in rustkleed kunnen, behalve de buik en de stuit een grauwe indruk maken. Vliegt vlakker en iets sneller dan de Vink.
30. **Europese Kanarie**
Klein, zeer korte snavel en ronde kop. Korte diep gevorkte staart. Gele stuit, maar geen opvallende gele tekening aan de staart.
31. **Groenling**
Contrastloze groene tot grauwoene koptekening. Geelachtige tot gele handpennen en staartwortel. De diep gevorkte staart is korter dan bij de evengrote vinkachtigen.
32. **Putter**
Onverwisselbaar met grote gele vleugelbanden, die zelfs op grote afstand nog te zien zijn. Witte stuit. Volwassen vogels met rood aangezicht, jonge vogels met bruinachtige kop.
33. **Sijs**
Maakt door de langere snavel niet zo'n rondkoppige indruk als de Europese Kanarie. Staart gevorkt, kortere staart dan Kneu, waarvan hij overigens op grote afstand moeilijk te onderscheiden is.
34. **Kneu**
Bruin. Witte slagpenzomen, die bij de tegen het lichaam gehouden vleugel een lichte parallel aan het lichaam verlopende streep opleveren. Langere staart dan Sijs. Lichaamstekening (vooral de onderkant) contrastloos.
35. **Frater**
Bruin, zonder echt opvallende tekening. Minder wit in vleugels en staart dan Kneu. Twee vleugelstrepen. Lijkt tijdens vlucht op Kneu, maar iets slanker en iets langere staart dan deze. Bovendelen gestreept.
36. **Barmsijs**
Vergeleken met Kneu en Frater kleiner, korter en dikker. Kortere staart. Donkerder dan Kneu, zowel op boven- als onderzijde. Geen wit in staart of vleugel. Twee creme vleugelstrepen. Lichte, veerkrachtige, golvende vlucht.
37. **Kruisbek**
Vleugels bruin. Lichaam contrastloos grauwoen geelachtig of rood met bruin. Ook op afstand goed herkenbare kruissnavel. De soort maakt daardoor de indruk een langere kop te hebben dan bijvoorbeeld Groenling. Zeer snelle zwakke boogvlucht. Beste vlieger onder de vinkachtigen.
38. **Ijsgors**
Lijkt qua tekening op Rietgors, maar is een veel betere vlieger.
39. **Sneeuwgorz**
Onmiskkenbaar zwart/bruin/wit.
40. **Geelgorz**
Relatief lange staart. Staart smal, vooral aan de wortel. Onderkant geelachtig tot schelgeel. Vliegt in gelijkmatig zwakke golven. Tijdens het opstijgen wisselen golven van verschillende lengte en korte vleugelslagfasen elkaar af.
41. **Ortolaan**
Betere vlieger dan de andere gorzen, vlucht ongeveer als Boompieper.
42. **Rietgorz**
Rustkleden, die tijdens de trek bijna uitsluitend voorkomen, vertonen in de vlucht een verticale witte streep als afgrenzing van de oorstreek

Herkenning van Vogels

(halsband). Overeenkomsten met Oever/Waterpieper en Graspieper, maar met rondere kop en langere staart met zeer smalle basis. De fladderende nerveuze vlucht maakt de indruk van een aaneenrijging van onregelmatige horizontale en verticale zigzagbewegingen.